

第2類医薬品

外用皮膚疾患用薬

**MEDICARE**<sup>®</sup>

メディケアシリーズ

【販売名】日やけ・やけどに  
**パンパス軟膏**


この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
なお、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

### 日やけ、やけどによる炎症とは…

過剰な紫外線を浴びることで、皮膚はダメージを受け、皮膚の赤み、ヒリヒリ続く痛み、水ぶくれ、炎症などの肌トラブルが引き起こされます。悪化する前に効果的な治療をしましょう。

### パンパス軟膏は

パンパス軟膏は、炎症を起こした日やけ、やけどを効果的に治療します。酸化亜鉛が炎症を抑え、保護し、フェノールやイソプロピルメチルフェノールが殺菌・消毒し、化膿を防ぎ、サリチル酸が角質軟化し、ヨークレシチンが血行を良くし、治りを早める医薬品です。刺激の少ない軟膏タイプで、患部にしっかり塗布できます。



(イメージ図)

### ⚠️ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 患部が広範囲の人
  - (4) 湿潤やただれのひどい人
  - (5) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

日やけ、やけど、きりきず、すりきず、しもやけ、ひび、あかぎれ、かぶれ、ただれ、よう、ちょう、くさ、痔

## 用法・用量


1日2～3回患部に塗布又は貼用してください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

### 【チューブの穴のあけ方】

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。



## 成分・分量

(100g中)

成分	含量	はたらき
酸化亜鉛	6.0g	消炎・保護のはたらきがあります。
フェノール	0.5g	殺菌消毒作用があります。
サリチル酸	0.1g	角質軟化作用があります。
イソプロピルメチルフェノール	0.05g	患部を殺菌し、化膿を防ぎます。
ヨークレシチン	0.5g	血行を良くするはたらきがあります。

添加物として、コレステロール、ステアリルアルコール、サラシミツロウ、精製ラノリン、ワセリン、香料を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。  
 森下仁丹株式会社【お問合せ先】 ☎0120-181-109  
 受付時間 平日9:00～21:00(土、日、祝日9:00～17:00)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

発売元 **森下仁丹株式会社**  
 大阪府中央区玉造1丁目2番40号  
<http://www.jintan.co.jp>

製造 **万協製薬株式会社**  
 販売元 三重県多気郡多気町五桂11 69-14-2