

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

第2類医薬品

乗物酔い薬



乗物酔いに

ポード

【販売名】

船やバスなどの乗物にゆられて気分が悪くなったり、頭痛やめまい、吐き気等をもよおすことほど辛いものではありません。
ポードは、このような乗物酔いを予防したり、抑制するのに効果のあるすぐれた成分を配合した薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)高齢者
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5)次の症状のある人
排尿困難
 - (6)次の診断を受けた人
緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】

乗物酔いの予防には、乗車船30分前に1回量を服用してください。なお必要に応じて追加服用する場合には、下記用量を4時間以上の間隔をおき服用してください。

1日2回まで服用できます。

1回量	15歳以上	7歳以上 15歳未満	7歳未満
	1瓶(10mL)	1/2瓶(5mL)	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

1瓶(10mL)中

成分	分量	はたらき
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.22mg	乗物によって起こる感覚の混乱を軽減します。
クエン酸カフェイン	80mg	眠気を予防し、頭痛を緩和します。
ピリドキシン塩酸塩	20mg	神経機能を正常化させます。

添加物として、D-ソルビトール、デヒドロ酢酸Na、香料、エタノール、バニリンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。

森下仁丹株式会社

お問合せ先 ☎0120-181-109

受付時間 平日9:00~21:00

(土・日・祝日9:00~17:00)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

発売元

製造販売元

森下仁丹株式会社

大昭製薬株式会社

大阪市中央区玉造1丁目2番40号

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

<http://www.jintan.co.jp>

「MEDICARE」、「メディケア」は
森下仁丹(株)の登録商標です。