

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿に浸して塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。(内服しないでください。)

成分・分量

(10mL中)

成分	含量	はたらき
ジブカイン塩酸塩	10mg	局所麻酔作用で痛みを和らげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	20mg	抗ヒスタミン作用で、痒みや腫れを抑えます。
ナファゾリン塩酸塩	10mg	局所の血管を収縮させ、止血します。
ベンゼトニウム塩化物	10mg	殺菌・消毒作用があり、化膿を防ぎます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

本品のお問合せは、お買い求めのお店、または次の所へお問合せください。

森下仁丹株式会社【お問合せ先】 ☎0120-181-109
平日9:00～21:00(土・日・祝日9:00～17:00)

副作用被害救済制度のお問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

森下仁丹株式会社
発売元 大阪市中央区玉造1丁目2番40号
<http://www.jintan.co.jp>

製造販売元 **株式会社 雪の元 本店**
奈良県橿原市大谷町182番地